



FORMULARIO DE RESUMENES PARA TEMAS LIBRES

Título	PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR: ASPECTOS CLÍNICOS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL
Autor	Luisa Camacho
Co-Autor	1. María Mercedes Pérez, Alfredo Caraballo, Heinz Mihalache
Institución	2. Hospital José Manuel de los Ríos
Categoría	Investigación original. Tópico: Cirugía Ginecológica (Malformaciones)

OBJETIVO: Conocer los aspectos clínicos de la patología obstructiva del tracto genital inferior en pacientes del servicio de ginecología infantil y juvenil. MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio longitudinal, retrospectivo y descriptivo en el que se revisaron historias de pacientes que presentaron patología obstructiva del tracto genital inferior entre enero 1991 y junio 2024. Se evaluó edad de consulta, tiempo transcurrido entre telarquia y edad de consulta, diagnóstico, motivo de consulta, síntoma concomitante, exámenes complementarios, resolución quirúrgica y evolución postoperatoria. RESULTADOS: La muestra obtenida fue 135, la edad más frecuente de consulta fue a los 13 años representando el 24 %. En el 31 % de las pacientes transcurrieron 2 años entre la telarquia y la edad de consulta. El diagnóstico más frecuente encontrado fue útero didelfo con hemivagina obstruida con 31,8 %, seguido de atresia del tercio inferior de vagina 21,4 %, himen imperforado 19,2 %, Tabique vaginal transverso 16,2 %, agenesia de cuello y vagina 2,22 % y otras 8,8 %. El dolor pélvico fue el motivo de consulta más frecuente presentado por el 52,8 %, seguido de referencias por tumor pélvico en 7,7 %. A todas las pacientes se les realizó ecografía pélvica encontrándose en la mayoría hematocolpometra, seguido de útero didelfo con hematocolpometra. Respecto a la conducta quirúrgica predominó la resección parcial del tabique vaginal, seguido de vaginoplastia. CONCLUSIONES: Es importante realizar la evaluación minuciosa de la recién nacida, está permite el diagnóstico temprano de malformaciones. La edad usual para presentar síntomas asociados a patología obstructiva es entre 12 y 13 años, por lo que es frecuente que estas pacientes sean evaluadas en las emergencias por el médico de guardia; presentando dolor pélvico secundario a criptomenorrea, el diagnóstico no adecuado puede ocasionar realizar procedimientos innecesarios. La ecografía pélvica realizada por manos expertas es una excelente herramienta.



DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL TRABAJO

Nombre del Trabajo	PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR: ASPECTOS CLÍNICOS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL				
Expositor Institución	Alfredo Caraballo/María Mercedes Pérez				
	Hospital de Niños J.M. de los Ríos				
Dirección Localidad E-mail	Caracas, Venezuela			Cód. Postal	1010
		Providencia		País	
	mperez62@gmail.com		Tel/Fax	+58-4166335178	