



FORMULARIO DE RESUMENES PARA TEMAS LIBRES

Título	ANEMIA Y TRASTORNOS PSICOLOGICOS EN ADOLESCENTES CON HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL. UN ANALISIS DESCRIPTIVO		
Autor	Jorge Corimanya		
Co-Autor			
Institución	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		
Categoría	TRABAJO ORIGINAL		
OBJETIVO Determinar la frecuencia de las principales causas de hemorragia uterina anormal (HUA) en adolescentes y la de la disfunción ovulatoria como etiología principal, así como la prevalencia de anemia, ansiedad y depresión en adolescentes que acuden a una institución pediátrica especializada. METODO Estudio observacional descriptivo correlacional de corte transversal que evaluó las historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de hemorragia uterina anormal en un periodo de 5 años, y mediante una ficha de recolección de datos se midió la frecuencia de los diagnósticos de hemorragia uterina anormal, disfunción ovulatoria, coagulopatías y otras causas, diagnóstico de ansiedad y de depresión, estableciendo la incidencia de anemia y estancia hospitalaria. RESULTADOS Se encontró 67 pacientes adolescentes con el diagnóstico de HUA, de las cuales 51 (76.12%) correspondieron a Hemorragia uterina disfuncional, siendo 10 casos relacionados con coagulopatías (14.93%) y 6 (8.96%) por otras causas. La población estudiada en su mayoría correspondió al grupo etario de adolescencia temprana de 10 a 14 años con 94% de los casos. Asimismo, se detectó el diagnóstico de ansiedad en el 11.94% y de depresión en el 14.93% en la mencionada población siendo mayor en el grupo etario de 10 a 14 años con 12.67% de ansiedad y 15.87% de depresión. De las pacientes que contaban con el dato el 81.03% presentaron el diagnóstico de anemia, siendo la más frecuente la anemia moderada con 41.38% de los casos de anemia, siendo las pacientes tributarias de transfusión de 17.24% y las pacientes que necesitaron hospitalizarse fueron el 44% y ocuparon en promedio 3.96 días/ cama. DISCUSION Observamos al igual que estudios previos que la mayor frecuencia de adolescentes con HUA corresponde a la disfunción ovulatoria y es predominante el grupo de menor edad ginecológica siendo la principal consecuencia clínica, la anemia. La ansiedad y depresión alcanzan baja frecuencia, pero en el grupo de 10 a 14 años superior a lo informado por la OMS CONCLUSION La etiología más frecuente de la HUA en adolescentes es la Disfunción ovulatoria y la anemia en diferentes grados, es la mayor consecuencia, y en menor grado los trastornos psicológicos.			

DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL TRABAJO

Nombre del Trabajo				
Expositor				
Institución				
Dirección			Cód. Postal	
Localidad		Provincia		País
E-mail			Tel./Fax	