



FORMULARIO DE RESUMENES PARA TEMAS LIBRES

Título	Surco perineal diagnóstico tardío: A propósito de un caso.
Autor	Josimar Rivas
Co-Autor	María Mercedes Pérez. Luisa Camacho. Adelvi Nieto
Institución	Hospital José Manuel de los Ríos
Categoría	Caso Clínico

INTRODUCCION: Se presenta caso de preescolar femenina de 3 años, con surco perineal, malformación ano rectal baja, caracterizada por comunicación entre la horquilla vulvar con la región anal. Dicha MAR, puede confundirse con una agresión sexual, con todas las consecuencias que ello implica, evaluaciones y planteamientos no indicados.

REPORTE DE CASO: Se trata de preescolar de 3 años, que presenta surco perineal desde su nacimiento, al examen físico, se evidencia mamas Tanner 1, sin presencia de nódulos, genitales externos, fenotipo femenino, pubarquia Tanner 1, labios mayores que cubren menores, himen anular delgado. A nivel del periné se evidenció surco lineal entre la horquilla vulvar y el ano, cubierta por mucosa eritematosa, sin epitelio, que no compromete orificio anal Se indica aseo bulbo perineal y se mantiene conducta expectante. Siendo evaluada al mes sin mejoría se indica petrolato (vaselina) para lubricación del área para epitelización y control sucesivo.

DISCUSIÓN

La malformación de la línea media el surco perineal es infrecuente. Es un surco húmedo, mucoso y no queratinizado localizado en la línea media del periné desde la horquilla vulvar al borde anal anterior. Se considera con una nula o escasa expresividad clínica, y tiende a la epitelización espontánea, su tratamiento no es específico.

La sintomatología descrita es defecación dolorosa, fisura anal, prurito, por lo general el surco perineal no suele causar molestias que limiten significativamente la vida diaria del paciente.

Debido a la tendencia espontánea a la epitelización, no se considera necesario ningún tipo de tratamiento, excepto cuando este asociado a otro tipo de malformaciones. El tratamiento es conservador y la corrección quirúrgica se reserva para aquellos pacientes en los que la epitelización no ocurre a los 2 años de vida. Se ha planteado el uso de pretolato para la epitelización del área, sin embargo, son pocos los estudios realizados.



DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL TRABAJO

Nombre del Trabajo	Surco perineal diagnóstico tardío: a propósito de un caso.				
Expositor Institución	María Mercedes Pérez Alonso				
	Hospital José Manuel de los Ríos				
Dirección Localidad E-mail	Caracas, Venezuela			Cód. Postal	1010
	San Bernardino	Providencia		País	
	mperez62@gmail.com		Tel/Fax	+58-4166335178	